

## 4種類のアモナイトを見分けよう

← から  
見た様子


### ダクティリオセラス属の一種

- ・殻の幅が薄い
- ・ヘソは浅く広い

学名：*Dactyloceras* sp.

産地：イギリス、ヨークシャー州

時代：前期ジュラ紀トアルシアン期  
(約1億8千万年前)




### オルソスフィンクテス属の一種

- ・殻の幅が厚い
- ・肋の輪郭は比較的是っきり

学名：*Orthosphinctes* sp.

産地：マダガスカル、トゥリアラ州

時代：後期ジュラ紀オックスフォードイアン期  
(約1億6千万年前)




### リエリセラス属の一種

- ・ヘソが浅い
- ・腹側の突起が3列または5列  
(正中線上に突起がある)

学名：*Lyelliceras* sp.

産地：ペルー、ワヌコ県

時代：前期白亜紀アルビアン期  
(約1億1千万年前)



### ドウビレイセラス属の一種

- ・ヘソが深い
- ・殻の幅が厚い(ずんぐり)
- ・腹側の突起が2列または4列  
(正中線上には突起がない)

学名：*Douvilleiceras* sp.

産地：マダガスカル、マハジャンガ州

時代：前期白亜紀アルビアン期  
(約1億1千万年前)

