


302. *Tenthredo shishikuensis* (Togashi, 1963)

シシクハバチ (図128)




【寄主植物】未知。
【分布】本州。

美幌郡温泉町畑ヶ平, 2♀, 1954. V. 28, 奥谷禎一; 同, 1♀, 1955. V. 24, 奥谷禎一 (KU); 扇ノ山, 900m, 1♀, 1992. VI. 20, 池田隆直。

303. *Tenthredo smithiana* Togashi, 1977

スミスシロオビハバチ (新称, 図129)




【寄主植物】未知。
【分布】本州。

神戸市六甲山大月地獄谷, 1♂ 2♀, 1969. IX. 21, 採集者不明 (KU); 美幌郡波賀町赤西溪谷, 680m, 1♀, 1992. IX. 5, 池田隆直。

304. *Tenthredo smithii* Kirby, 1882

トガリハチガタハバチ

本種の学名は従来 *Tenthredo fortunei* (Kirby, 1882) とされていたが, Shinohara (2002a) により, 真の *T. fortunei* Kirby, 1882 (*fortunei* は修正名) は別種であり, 日本のトガリハチガタハバチは上記学名に該当することが明らかにされた。



【寄主植物】ヤマホトトギス, ササユリ, ウバユリ, シオデ類 (シオデ, サルトリイバラ)。

【分布】北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬; 朝鮮半島, インド? (Shinohara, 2002a)。

神戸市, 1♂, 1982. V. 12, 池田隆直; 灘区, 1♀, 1986. V. 18, 池田隆直; 同, 1♂ 1♀, 1986. V. 8, 池田隆直; 灘区長峰山, 1♀, 1982. V. 18, 池田隆直; 同, 200m, 3 exs., 1982. V. 18, 鈴木壽也; 中央区再度谷, 1♂, 1965. VI. 24, 田中梓 (MNHAH); 再度山, 1♂, 1961. V. 13,


内藤親彦 (KU); 兵庫区, 1♀, 1986. V. 13, 池田隆直; 北区谷上, 300m, 1 ex., 1973. VI. 2, 内藤親彦 (KU); 北区山の街, 1♂ 1♀, 1959. V. 10, 中西明德 (KU); 同, 1♀, 1959. V. 10, 内藤親彦 (KU); 北区下谷上, 200m, 1♀, 2000. V. 28, 吉田浩史; 北区藍那, 250m, 2♂ 2♀, 2001. V. 28, 吉田浩史; 同, 1♀, 2001. VI. 10, 吉田浩史; 西宮市甲東園, 1♀, 1933. V. 6, 戸沢信義 (OMNH); 川西市黒川, 250m, 1♀, 1993. V. 15, 杉浦直人 (B1258997); 篠山市, 1♀, 1952. IV. 3, 奥谷禎一 (KU); 同, 1♀, 1952. V. 30, 奥谷禎一 (KU); 同, 1♀, 1952. VI. 3, 奥谷禎一 (KU); 同, 1♀, 1952. VI. 4, 岩田久二雄 (KU); 同, 1♂, 1953. V. 16, 奥谷禎一 (KU); 同, 1♂, 1953. V. 18, 三木正士 (KU); 同, 1♀, 1953. V. 26, 野原啓吾 (KU); 同, 1♀, 1953. VI. 13, 野原啓吾 (KU); 同, 1♀, 1954. V. 30, 野原啓吾 (KU); 同, 4♀, 1955. IV. 10, 奥谷禎一 (KU); 同, 2♀, 1955. IV. 15, 奥谷禎一 (KU); 同, 1♀, 1955. IV. 25, 奥谷禎一 (KU); 岡野, 2♀, 1955. IV. 15, 奥谷禎一 (KU); 同, 1♀, 1956. V. 18, 奥谷禎一 (KU); 四斗谷, 1 ex., 1997. V. 18, 森田年則 (B1365700); 飾磨郡夢前町亀ヶ壺, 350m, 1♀, 1994. V. 29, 森田年則; 同, 1♀, 1994. VI. 15, 森田年則; 同, 2♂ 1♀, 1994. VI. 22, 森田年則; 佐中, 200m, 1♂ 1♀, 1994. VI. 15, 森田年則 (B1293677・8); 佐用郡佐用町奥海, 400m, 2♀, 1995. V. 5, 鈴木壽也 (B1341651・2); 同, 500m, 1♀, 1995. V. 19, 鈴木壽也 (B1341653); 海内, 500m, 1♂ 2♀, 1995. V. 6, 鈴木壽也 (B1341654~6); 若州, 400m, 1♀, 1995. V. 17, 鈴木壽也 (B1341657); 同, 320m, 1♀, 1995. V. 27, 飯塚哲也 (B1341658); 佐用郡三日月町鎌倉, 180m, 1♀, 1995. VI. 2, 飯塚哲也 (B1341660); 弦谷, 140m, 1♀, 1995. VI.

30, 内藤親彦 (B1341659); 美幌郡山崎町葛沢, 400m, 1♂ 1 ex., 1994. IX. 25, 植田義輔 (B1293674・5); 美幌郡一宮町, 500m, 1♀, 1994. V. 28, 鈴木壽也 (B1293676); 美幌郡波賀町赤西溪谷, 1♀, 2002. V. 26, 池田隆直; 音水溪谷, 580m, 1♀, 1992. VI. 8, 森田年則; 美幌郡温泉町畑ヶ平, 1♀, 1955. V. 24, 奥谷禎一 (KU); 扇ノ山, 860m, 1♀, 2002. VI. 1, 内藤親彦 (MNHAH); 養父郡関宮町水ノ山, 1♀, 1956. VI. 6, 奥谷禎一 (KU)。

305. *Tenthredo ussuriensis* (Mocsáry, 1909)

マエグロコシホソハバチ (図130)

従来本種の学名は *Tenthredo analis* (André, 1881) とされていたが, Taeger (1988) により上記の学名が有効名とされた。




【寄主植物】ツクバネウツギ類 (ツクバネウツギ, コツクバネウツギ)。

【分布】北海道, 本州, 四国, 九州; シベリア, 朝鮮半島, 中国 (李ら, 2000)。

神戸市そば谷, 1♀, 1964. VI. 11, 田中梓 (MNHAH); 灘区, 1♀, 1985. V. 24, 池田隆直; 灘区六甲山町, 810m, 1♀, 1993. VI. 21, 森田年則; 中央区再度山, 1♂, 1965. VI. 7, 田中梓 (MNHAH); 同, 3♂ 1♀, 1990. V. 28, 杉浦直人 (B1018994・9003・8・9); 同, 2♀, 1990. VI. 6, 杉浦直人 (B1018995・9004); 同, 1♀, 1990. VI. 12, 杉浦直人 (B1018999); 兵庫区平野, 1♀, 1941. VI. 5, S. 田中 (MNHAH); 同, 3♂ 2♀, 1986. V. 13, 池田隆直; 北区, 1 ex., 1941. VI. 5, S. 田中 (MNHAH); 北区山の街, 1♂, 1959. V. 10, 中西明德 (KU); 北区谷上, 300m, 1♀, 1973. VI. 2, 内藤親彦 (KU); 北区藍那, 250m, 1♂, 2001. IV. 28, 吉田浩史; 宝塚市, 1♀, 1997. V. 25, 池田隆直; 武田尾, 200m, 1♀, 1993. V. 24, 池田隆直 (B1259008); 同, 1♀, 2002. VI. 4, 池田隆直; 篠山市, 1♀, 1952. V. 15, 岩田久二雄 (KU); 同, 2♀, 1952. V. 16, 奥谷禎一 (KU); 同, 1♀, 1952. V. 18, 岩田久二雄 (KU); 同, 1♂, 1952. V. 29, 奥谷禎一 (KU); 同, 1♀, 1952. V. 29, 谷口セツ (KU); 同, 3♀, 1952. VI. 3, 奥谷禎一 (KU); 同, 2♀, 1952. VI. 4, 岩田久二雄 (KU); 同, 1♀, 1956. V. 18, 奥谷禎一 (KU); 同, 1♂, 1957. IV. 24, 奥谷禎一 (KU); 同, 1♂, 1962. V. 20, 内藤親彦 (KU); 藤岡, 1♀, 1963. VI. 3, 奥谷禎一 (KU); 同, 4♀, 1966. V. 31, 奥谷禎一 (KU); 多可郡加美町千ヶ峰, 1♀, 1964. VI. 7, 猪股涼一 (B1298509); 三国岳, 1♂, 1959. VI. 3, 猪股涼一 (B1298513); 多可郡八千代町笠形山, 1♀, 1958. VI. 15, 猪股涼一 (B1298506); 同, 3♂, 1959. VI. 7, 猪股涼一 (B1298510~2); 同, 1♀, 1960. V. 30, 猪股涼一 (B1298508); 飾磨郡夢前町亀ヶ壺, 350m, 1♀, 1994. VI. 4, 森田年則; 熊部, 280m, 1♂, 1994. V. 8, 森田年則; 美幌郡波賀町赤西溪谷, 680m, 2♀, 1994. VI. 11, 池田隆直; 同, 1♀, 1996. VI. 1, 池田隆直; 坂ノ谷林道, 700m, 1♀, 1993. VI. 24, 森田年則; 同, 1♀, 2002. VI. 1, 森田年則; 美幌郡温泉町扇ノ山, 1♀, 1966. VI. 8, 内藤親彦 (KU); 養父郡関宮町鉢伏高原, 860m, 1♀, 2000. VI. 20, 重村太博 (B1479582)。

306. *Tenthredo versuta* Mocsáry, 1909

ハコネハバチ (図131)



【寄主植物】未知。


【分布】北海道, 本州, 四国, 九州, 対馬; サハリン, 朝鮮半島 (李ら, 2000)。

多可郡八千代町笠形山, 1♀, 1960. VI. 12, 猪股涼一 (B1298658); 同, 1♂ 1♀, 1960. VIII. 4, 猪股涼一 (B1298659・64); 同, 2♂, 1960. VIII. 5, 猪股涼一 (B1298660・3); 神崎郡大河内町峰山高原, 900m, 1♀, 1977. VI. 11, 森田年則; 美幌郡波賀町赤西溪谷, 1♀, 1990. VI. 10, 池田隆直 (B1019701); 同, 1♀, 1990. VIII. 1, 上野高敏 (B1019716); 同, 700m, 1♀, 1992. VIII. 27, 二井清友 (B1212912); 同, 680m, 2♀, 1997. VI. 21, 森田年則; 同, 680m, 1♀, 2000. VI. 24, 森田年則 (B1479583); 音水溪谷, 1♀, 1962. VIII. 10, 奥谷禎一 (KU); 同, 1♂, 1964. VI. 21, 猪股涼一 (B1298662); 同, 580m, 1♂, 1992. VI. 8, 森田年則; 同, 900m, 1♀, 1992. VI. 8, 森田年則 (B1212911); 美幌郡温泉町扇ノ山, 900m, 1♀, 1991. VII. 14, 森田年則 (B1112026); 同, 860m, 1♂, 1999. VIII. 1, 重村太博 (B1479208); 同, 860m, 1 ex., 2002. VII. 28, 内藤親彦 (MNHAH); 霧ヶ滝, 1♀, 1969. VIII. 18, 奥谷禎一 (KU); 畑ヶ平, 1100m, 1♀, 1999. VII. 15, 池田隆直 (B1479207); 同, 848m, 1♀, 1999. VII. 15, 鈴木壽也 (B1479209); 扇ノ山, 900m, 1♀, 1992. VI. 21, 池田隆直 (B1212904); 同, 900m, 2♀, 1992. VI. 27, 池田隆直 (B1212905・6); 同, 900m, 4♀, 1992. VII. 5, 池田隆直 (B1212900~3); 養父郡八鹿町妙見山, 1♂, 1959. VIII. 2, 猪股涼一 (B1298661); 名草神社, 800m, 1♀, 1992. VIII. 27, 久ノ坪ゆかり (B1212909); 養父郡大屋町横行溪谷, 1000m, 1♀, 1992. VIII. 22, 森田年則 (B1212907); 同, 1♀, 1992. VIII. 23, 北尾昌弘 (B1212908); 養父郡関宮町水ノ山, 1♀, 1952. VII. 11, 永富昭 (KU); 同, 1♀, 1954. VII. 22, 山本義丸 (MNHAH); 同, 1♀, 1966. VIII. 19, 21, 田中梓 (MNHAH); 同, 1200m, 1♀, 1992. VIII. 7, 鈴木壽也 (B1212910)。

307. *Tenthredo viridatrix nippon* Shinohara, 1994

トゲムネアオハバチ (図132)

Shinohara (1994) により、日本及びサハリンの個体群が新亜種として記載された。




【寄主植物】未知。
【分布】北海道、本州、四国、九州；サハリン (Shinohara, 1994)。

穴栗郡波賀町赤西溪谷, 700m, 1 ♀, 1992. V. 31, 鈴木壽也 (B1212896); 同, 700m, 1 ♂, 1992. V. 31, 森田年則 (B1212897); 美方郡温泉町, 680m, 1 ♀, 1995. IX. 9, 池田隆直; 扇ノ山, 900m, 1 ♀, 1991. IX. 6, 上野高敏 (B1112017); 同, 800m, 1 ♀, 1991. IX. 7, 森田年則; 同, 800m, 1 ♀, 1991. IX. 8, 森田年則; 同, 900m, 4 ♀, 1991. IX. 8, 森田年則 (B1112013~6); 同, 1 ♀, 1953. VIII. 18, 奥谷禎一 (KU); 同, 1 ♂ 1 ♀, 1953.

VIII. 19, 奥谷禎一 (KU); 上山高原, 900m, 1 ♀, 1999. VIII. 1, 中峰空 (B1479217); 畑ヶ平, 860m, 1 ♀, 1999. IX. 5, 竹中勲 (B1479216); 同, 2 ♂, 1954. VII. 25, 奥谷禎一 (KU); 同, 1 ♀, 1954. VII. 26, 奥谷禎一 (KU); 同, 1 ♀, 1958. VII. 15, 奥谷禎一 (KU); 養父郡関宮町氷ノ山, 1 ♀, 1951. VIII. 8, 永富昭 (KU); 同, 1 ♂, 1951. VIII. 9, 岩田久二雄 (KU); 同, 1 ♀, 1952. VII. 29, 奥谷禎一 (KU); 同, 1 ♀, 1952. VIII. 11, 岩田久二雄 (KU); 同, 1 ♀, 1958. VI. 16, 奥谷禎一 (KU); 同, 1 ♀, 1958. VI. 17, 奥谷禎一 (KU); 同, 2 ♀, 1963. VII. 19, 奥谷禎一 (KU); 同, 1 ♂ 1 ♀, 1965. VIII. 5, 辻啓介 (KU)。

308. *Tenthredopsis carinata japonica* Takeuchi, 1956

ヒゲナガクロホソハバチ (新称, 図133)



【寄主植物】未知。
【分布】北海道、本州、四国、九州；千島。

篠山市東浜谷, 260m, 1 ♂, 1988. V. 29, 森田年則; 飾磨郡夢前町, 500m, 1 ♂ 1 ♀, 1978. V. 20, 森田年則; 佐中, 200m, 10 ♂, 1994. V. 8, 森田年則; 神崎郡神崎町作畑, 200m, 1 ♂, 1996. V. 18, 森田年則; 同, 6 ♂, 1996. V. 26, 森田年則; 佐用郡佐用町海内, 300m, 1 ♂, 1995. IV. 29, 森田年則; 同, 1 ♂, 1995. V. 7, 森田年則; 養畑, 240m, 1 ♂, 1995. V. 20, 森田年則; 同, 1 ♀, 1995. V. 27, 森田年則; 穴栗郡波賀町赤西溪谷, 680m, 1 ♀, 1983. V. 29,

森田年則; 同, 2 ♂, 1984. VI. 3, 森田年則; 同, 1 ♂, 1985. V. 6, 森田年則; 同, 1 ♂, 1985. VI. 2, 森田年則; 同, 1 ♀, 1988. VI. 5, 森田年則; 同, 1 ♀, 1990. VI. 17, 森田年則; 同, 1 ♀, 1990. VI. 22, 森田年則; 同, 4 ♂, 1992. V. 31, 森田年則; 同, 1 ♀, 1992. VI. 13, 森田年則; 同, 1 ♂, 2001. V. 13, 森田年則; 同, 1 ♂, 2001. V. 20, 森田年則; 同, 2 ♀, 2001. VI. 2, 森田年則。


Cephidae クキバチ科

Cephinae クキバチ亜科

日本からは8属15種の記録がある。兵庫県からはこのうち、全国的に記録例の少ない *Sinicephus* 属と、Shinohara (1999) により追加された *Caenocephus*, *Stenocephus* を除く5属7種が記録された。

309. *Calameuta nigripennis* (Takeuchi, 1927)

クロバクキバチ (図134)




【寄主植物】カモジグサ。
【分布】本州、四国、対馬；東シベリア、朝鮮半島。

神戸市灘区青谷, 4 ♂, 1977. V. 25, 広瀬成俊 (KU); 中央区再度山, 1 ♀, 1964. V. 29, 田中梓 (MNHAH); 宝塚市武田尾, 100m, 1 ♂, 1993. VI. 13, 森田年則; 西脇市, 1 ♀, 1958. V. 27, 猪股涼一 (MNHAH); 羽安, 1 ♂ 1 ♀, 1961. VI. 2, 猪股涼一 (MNHAH); 加西市奥池, 400m, 1 ♀, 1996. VI. 2, 水野早織 (B1354424); 篠山市, 1 ♂, 1952. VI. 13,

奥谷禎一 (KU); 同, 1 ♂, 1952. VI. 14, 奥谷禎一 (KU); 同, 1 ♂, 1958. VI. 4, 奥谷禎一 (KU); 同, 1 ♂, 1958. VI. 7, 奥谷禎一 (KU); 洲本市先山, 400m, 1 ♂ 1 ♀, 1990. VI. 3, 森田年則; 佐用郡佐用町奥海林道, 400m, 1 ex., 1995. V. 13, 内藤親彦 (B1341421); 養畑, 240m, 1 ♀, 1995. VI. 11, 森田年則; 佐用郡上月町大日山川, 180m, 1 ♀, 1995. VI. 10, 笹井隆邦 (B1341416); 佐用郡三日月町鎌倉, 180m, 1 ♂ 1 ♀, 1995. V. 27, 笹井隆邦 (B1341417~8); 穴栗郡波賀町赤西溪谷, 700m, 2 ♂, 2001. V. 6, 吉田浩史。

310. *Cephus brachycercus* Thomson, 1871

日本からは、Smith and Shinohara (2002) により初めて記録された。




【寄主植物】未知。
【分布】本州／青森・兵庫・旧北区 (Smith and Shinohara, 2002)。

篠山市, 1 ♂ 1 ♀, 1954. V. 27, 桃井節也 (KU)。

311. *Hartigia agilis* (Smith, 1874)

オオバラクキバチ (図135)




【寄主植物】バラ類。
【分布】本州、四国、九州。

神戸市灘区青谷, 2 ♂, 1977. IV. 27, 丸橋温 (KU); 同, 200m, 1 ♂ 1 ♀, 1978. V. 1, 森田年則; 兵庫県平野, 1 ♂, 1941. IV. 29, S. 田中 (MNHAH); 同, 1 ♀, 1942. IV. 27, S. 田中 (MNHAH); 北区藍那, 250m, 1 ♂, 1997. IV. 26, 吉田浩史; 同, 1 ♂, 2001. V. 6, 吉田浩史; 西宮市名塩, 50m, 1 ♂, 1999. IV. 25, 吉田浩史; 西脇市, 1 ♂, 1960. IV. 29, 猪股涼一 (MNHAH); 篠山市, 1 ♀, 1964. IV. 18, 内藤親彦 (KU); 真南条中, 300m, 1 ♂, 1982. V. 9, 森田年則; 同, 1 ♀, 1983. V. 3, 森田年則; 同, 1 ♂, 1989. V. 4, 森田年則; 同, 1 ♀, 1990. V. 20, 森田年則; 神崎郡大河内町, 320m, 1 ♀, 1977. V. 8, 森田年則; 佐用郡佐用町海内, 300m, 1 ♀, 1995. V. 7, 森田年則; 佐用郡南光町り寺, 1 ♂, 1977. IV. 29, 広瀬成俊 (KU); 穴栗郡山崎町与位, 160m, 1 ♀, 1994. IV. 29, 内藤親彦 (B1294185); 津名郡北淡町浅野公園, 1 ♂, 1990. V. 6, 鈴木壽也; 三原郡南淡町灘, 7 exs., 1990. IV. 15, 内藤親彦 (B1020177・80・82~86); 同, 1 ex., 1990. IV. 15, 杉浦直人 (B1020181); 論鶴羽山, 1 ex., 1990. IV. 15, 森田年則 (B1020178)。

312. *Janus japonicus* Sato, 1926

モンクキバチ




【寄主植物】サンゴジュ、ガマズミ。
【分布】北海道、本州／東京・神奈川・石川・愛知・三重・京都・岡山・山口 (Shinohara, 1999)。

篠山市, 1 ♂, 1962. III. 5, 内藤親彦 (KU); 養父郡関宮町氷ノ山, 1 ♂, 1963. VI. 9, 内藤親彦 (KU)。

313. *Janus kashivorus* Yano et Sato, 1928

アカガシクキバチ (図136)




【寄主植物】アカガシ.
【分布】本州／東京・神奈川・兵庫・岡山、九州／長崎 (Shinohara, 1999).

三田市波豆川, 250m, 1♀, 1983. V. 8, 森田年則; 篠山市, 1♀, 1965. V. 6, 内藤親彦 (KU).

316. *Sirex nitobei* Matsumura, 1912

ニトベキバチ (図138・139)




【寄主植物】マツ類 (アカマツ, クロマツ), カラマツ, スギ (奥谷, 1987).

【分布】北海道, 本州, 九州; 朝鮮半島.

神戸市中央区再度山, 1♀, 1967. V. 19, 田中梓 (MNHAH); 同, 1♂ 1♀, 1967. XI. 9, 田中梓 (MNHAH); 篠山市小金ヶ嶽, 725m, 1♂, 1983. V. 4, 森田年則.

314. *Janus micromaculatus* Sato, 1926

ヒメモンクキバチ




【寄主植物】未知.
【分布】本州／新潟・神奈川・石川・三重・岡山、九州／福岡 (Shinohara, 1999).

篠山市東浜谷, 260m, 1♀, 2001. V. 5, 森田年則.

317. *Urocerus japonicus* (Smith, 1874)

ニホンキバチ (図140)




【寄主植物】スギ, ヒノキ, アカマツ, クロマツ, カラマツ, モミ, サワラ, ウラジロモミ, トドマツ, エゾマツ (奥谷, 1967a; 奥田, 1994).

【分布】北海道, 本州, 四国, 九州, 屋久島; 朝鮮半島.

神戸市中央区, 3exs., 1962. VIII. 5, 猪股涼一 (MNHAH); 中央区再度山, 2♂., 1968. VIII. 21, 田中梓 (MNHAH); 兵庫区, 1♀, 1940. IX. 13, K. 田中 (MNHAH); 西宮市, 1♂, 1967. VIII. 13, 採集者不明 (MNHAH); 小野市阿形町, 1♂, 1996. VIII. 3, 重村太博 (B1354421); 篠山市, 1♂, 1951. VII. 22, 岩田久二雄 (KU); 岡野, 1ex., 1955. IX. 8, 永富昭 (KU); 藤岡, 1♂, 1952. VII. 28, 三木正士 (KU); 多可郡加美町三国岳, 1♂, 1960. VIII. 18, 猪股涼一 (MNHAH); 多可郡八千代町笠形山, 4♂, 1962. VIII. 5, 猪股涼一 (MNHAH); 朝来郡生野町白口溪谷, 460m, 1♀, 1996. IX. 15, 水野早織 (B1354420); 養父郡関宮町氷ノ山, 1♀, 1951. VIII. 8, 永富昭 (KU); 同, 1♀, 1954. VIII. 22, 山本義丸 (KU).

315. *Syrista similis* Mocsáry, 1904

バラクキバチ (図137)




【寄主植物】バラ類.
【分布】北海道, 本州, 四国, 九州; 中国.

神戸市灘区青谷, 1♂, 1977. IV. 26, 森田年則; 同, 3♂, 1977. IV. 27, 森田年則; 同, 1♂, 1977. V. 1, 丸橋温 (KU); 同, 100m, 1♀, 1979. V. 3, 小杉由起夫 (KU); 北区藍那, 250m, 1♂, 2001. V. 6, 吉田浩史; 同, 1♀, 2002. V. 3, 吉田浩史; 西脇市, 1♂, 1958. V. 2, 猪股涼一 (MNHAH); 同, 1♂ 1♀, 1958. V. 4, 猪股涼一 (MNHAH); 同, 5♂, 1960. V. 5, 猪股涼一 (KU); 篠山市, 1♂, 1977. V. 11, 広瀬成俊 (KU); 多可郡中町徳畑, 300m, 1♀, 1996. V. 12, 飯塚

哲也 (B1354423); 神崎郡神崎町, 250m, 1♀, 1977. V. 9, 森田年則; 同, 1♂, 1978. V. 9, 森田年則; 神崎郡福崎町, 1♀, 1987. V. 6, 池田隆直; 宍粟郡波賀町赤西溪谷, 680m, 1♂, 1984. VI. 3, 森田年則; 三原郡南淡町灘, 1ex., 1990. IV. 15, 内藤親彦 (B1020187).

318. *Xeris spectrum spectrum* (Linnaeus, 1758)

オナガキバチ (図141)



【寄主植物】マツ属, モミ属, トウヒ属, トガサワラ属, カラマツ属, ヒノキ (奥谷, 1987).

【分布】北海道, 本州, 四国, 九州, 琉球; サハリン, シベリア, 台湾, ヨーロッパ.

神戸市灘区摩耶山, 1♂, 1963. VI. 8, 内藤親彦 (KU); 篠山市, 1♂, 1950. VI. 12, 岩田久二雄 (KU); 篠山市岡野, 1♂, 1956. VI. 16, 奥谷禎一 (KU); 飾磨郡夢前町亀ヶ壺, 350m, 1♀, 1994. VI. 4, 森田年則; 宍粟郡山崎町寺西, 250m, 1♂, 1995. VI. 17, 笹井隆邦 (B1341409).

Siricidae キバチ科

Siricinae キバチ亜科


日本からは4属10種の記録がある。兵庫県からはキバチ類の採集例は少なく、*Xoanon*属を除く3属3種が記録されているのみである。

Tremecinae ヒラアシキバチ亜科

日本からは2属9種の記録がある。兵庫県からは1属4種が記録された。

319. *Tremex apicalis* Matsumura, 1912

クロヒラアシキバチ (図142)




【寄主植物】サクラ属, カエデ属, ポプラ属, ヤナギ属, シラカシ (奥谷, 1987).

【分布】北海道, 本州, 四国, 九州; 中国, 朝鮮半島.

西宮市甲東園, 1♂, 採集年月日不明, 戸澤信義 (OMNH); 宍粟郡波賀町赤西溪谷, 1♀, 1980. VI. 15, 遠山雅夫 (KU).

320. *Tremex fuscicornis* (Fabricius, 1787)

キマダラヒラアシキバチ




【寄主植物】ブナ属, ポプラ属, ニレ属, ハンノキ属, カエデ属, クルミ属, サワグルミ属, カバノキ属, ケヤキ属, エノキ属 (奥谷, 1987).

【分布】北海道, 本州; 千島, サハリン, シベリア, 中国, 朝鮮半島, 台湾, ヨーロッパ.

神戸市北区山田町, 150m, 1♀, 1982. X. 23, 森田年則; 尼崎市, 1ex., 1944. X. 5, 新家 (MNHAH); 西宮市, 1ex., 1970. V. 6, K. 坂口 (KU).

321. *Tremex longicollis* Konow, 1896

ヒラアシキバチ




【寄主植物】エノキ.
【分布】本州, 四国, 九州; 中国, 朝鮮半島, 台湾.

西宮市甲東園, 1♀, 採集年月日不明, 戸澤信義 (OMNH); 加西市豊倉町, 1♀, 1996. VIII. 16, 二井清友.

322. *Tremex nakanei* Takeuchi, 1955

ナカネヒラアシキバチ (図143)



【寄主植物】コミネカエデ, イヌシデ.
【分布】本州/長野・兵庫, 四国/愛媛.


美方郡温泉町扇ノ山, 1♀, 1977. VII. 17, 遠山雅夫 (KU).

Xiphydriidae クビナガキバチ科

日本からは7属19種の記録がある. 兵庫県からは, 九州・南西諸島からのみ記録されている2属を除いた5属8種が記録されている.

323. *Euxiphidria potanini* (Jakovlev, 1892)

アカズクビナガキバチ (図144)




【寄主植物】イタヤカエデ (奥谷, 1987).

【分布】北海道, 本州, 四国; 千島, サハリン, 東シベリア, 中国, 朝鮮半島.

篠山市小金ヶ嶽, 1♂, 1959. VI. 7, 細見 (KU); 多可郡八千代町笠形山, 1♀, 1959. VI. 7, 猪股涼一 (MNHAH).

324. *Hyperxiphia leucopoda* (Takeuchi, 1938)

シロアシクビナガキバチ (図145)




【寄主植物】未知.

【分布】本州, 四国, 九州 (清山, 1989).

美方郡温泉町畑ヶ平, 1♂, 1954. VII. 24, 奥谷禎一 (KU).

325. *Palpoxiphia yamamotoi* Okutani, 1958

キイロクビナガキバチ (図146)



【寄主植物】未知.


【分布】本州, 九州.

【Holotype】♂, Mt. Hyonosen, Hyogo Pref., 22. VII. 1954, Y. Yamamoto leg. (KU).

養父郡関宮町氷ノ山, 1♂, 1954. VII. 22, 山本義丸 (上記Holotype).

326. *Platxiphydria tiphiformis* Takeuchi, 1938

ヒラクビナガキバチ (図147)




【寄主植物】未知.

【分布】本州, 四国, 九州, 佐渡島.

美方郡温泉町畑ヶ平, 1♂, 1954. V. 28, 奥谷禎一 (KU).

327. *Xiphydria annulitibia* Takeuchi, 1936

クロクビナガキバチ



【寄主植物】未知.

【分布】北海道, 本州, 四国; サハリン.

大栗郡波賀町赤西溪谷, 3♀, 1978. VI. 25, 遠山雅夫 (KU).

Orussidae ヤドリキバチ科

Orussinae ヤドリキバチ亜科


日本からは *Orussus* 属の4種の記録がある. 兵庫県からは未記録である.

Ophrynopinae トサヤドリキバチ亜科

日本からは1属1種, トサヤドリキバチのみが記録される. 兵庫県からは1個体が記録されているのみである.

331. *Stiricorsia tosensis* (Tosawa et Sugihara, 1934)

トサヤドリキバチ (図150)




【寄主】幼虫はタマムシなどの材穿孔性の甲虫の幼虫に寄生すると考えられている.

【分布】本州, 四国.

神戸市中央区再度山, 1♀, 1965. VI. 2, 田中梓 (MNHAH).

328. *Xiphydria buyssoni* Konow, 1903

キアシクビナガキバチ (図148)




【寄主植物】ハンノキ, カパノキ (奥谷, 1987).

【分布】本州, 四国, 九州; シベリア.

美方郡温泉町扇ノ山, 1♀, 1966. VII. 23, 仲井 (KU); 養父郡関宮町, 700m, 1♀, 1992. VII. 19, 森田年則.

329. *Xiphydria camelus* (Linnaeus, 1758)

アカアシクビナガキバチ (図149)




【寄主植物】ブナ, ミズナラ, ミズメ, ケヤマハンノキ, トチノキ.

【分布】北海道, 本州, 四国, 九州; 旧北区.

大栗郡波賀町赤西溪谷, 11♂ 2♀, 1978. VI. 25, 遠山雅夫 (KU); 養父郡関宮町氷ノ山, 2♂ 2♀, 1953. V. 28, 奥谷禎一 (KU).

330. *Xiphydria ogasawarai* Matsumura, 1927

ヒゲジロクビナガキバチ



【寄主植物】ハンノキ, カエデ類 (イロハカエデ, イタヤカエデ), トチノキ, オニグルミ.

【分布】北海道, 本州; 千島, シベリア, ウスリー.

大栗郡波賀町赤西溪谷, 1♀, 1978. VI. 25, 遠山雅夫 (KU).

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

旧多紀郡4町（篠山町・西紀町・丹南町・今田町）産の記録については、全て篠山市に統一して記録した。

・2004年4月1日、養父郡4町が合併し養父市となる。

- ・2004年4月1日、養父郡4町が合併し養父市となる。
- ・2004年11月1日、氷上郡6町が合併し丹波市となる。

西播磨																但馬												丹波					淡路										分布市町数	No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
龍野市	赤穂市	揖保郡		赤穂郡	佐用郡			宍粟郡			豊岡市	城崎郡	香住町	日高町	出石町	但東町	村岡町	浜坂町	美方町	温泉町	八鹿町	養父郡	大屋町	関宮町	生野町	和田山町	朝来町	山東町	篠山市	水上郡			洲本市	津名郡					三原郡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		新宮町	御津町	太子町	上郡町	佐用町	上月町	南光町	三日月町	山崎町	安富町	一宮町	波賀町	千種町																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

付図 兵庫県市町の位置（2004年1月30日現在での市町名を記載）



参 考 文 献

- Abe, M., 1988. A biosystematic study of the genus *Athalia* Leach of Japan (Hymenoptera, Tenthredinidae). *ESAKIA*, (26) : 91-131.
- Blank, S. M., 1998. Die mittel- und nordeuropaischen Selandriinae (Hymenoptera: Tenthredinidae). In: Taeger, A. and Blank, S. M. (Hrsg.): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Goecke & Evers, Keltern.
- Blank, S. M., 2002. Taxonomic notes on Strongylogasterini (Hymenoptera:Tenthredinidae). *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **104** : 692-701.
- Blank S. M. and Taeger, A., 1998. Comments on the taxonomy of Symphyta (Hymenoptera) (Preliminary studies for a catalogue of Symphyta, part 4). In: Taeger, A. and Blank, S. M. (Hrsg.): Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. Goecke & Evers, Keltern.
- Chou, L.-Y. and Naito, T., 1991. Name lists of insects in Taiwan - Hymenoptera : Symphyta. *Chinese J. Ent.*, **11** : 85-95.
- Forsius, R. 1925. Über einige ostasiatische *Macrophya*-arten. *Acta Societatis Pro Fauna et Flora Fennica*, **56**(4) : 1-15.
- 福岡誠行・黒崎史平・高橋晃 編, 2000. 兵庫県産維管束植物2. 人と自然, **11** : 85-104.
- 羽田義任・田埜正・奥野宏・野坂千津子・室田忠男・黒川秀吉・井上重紀, 1998. ハチ目. 福井県昆虫目録 (第2版) , pp.314-404. 福井県自然環境保全調査研究会昆虫部会.
- Hara, H. and Shinohara, A., 2000. A systematic study on the sawfly genus *Cimbex* of East Asia (Hymenoptera, Cimbicidae). *Jap. J. syst. Ent.*, **6** : 199-224.
- 平嶋義宏(監修), 1989. 日本産昆虫総目録II. 九州大学農学部昆虫学教室・日本野生生物研究センター共同編集.
- Inomata, R., 1967. On a new species allied to *Tenthredo gifui* from Japan. *Kontyu*, **35** : 51-54.
- 猪股涼一, 1969. *Pachyprotasis*属 (ハバチ科) 幼虫の食性について〔その1〕 - キク科植物を食草とする種類 -. 松影, **5** : 27-65.
- Inomata, R., 1970. Taxonomic and biological studies on *Pachyprotasis* (Hymenoptera, Tenthredinidae). I. Descriptions of 16 new species from Japan. *MUSHI*, **43** : 1-27.
- 猪股涼一, 1981. *Pachyprotasis*属 (ハバチ科) 幼虫の食性について〔その2〕 - シソ科植物を食草とする種類 -. 川西高校職員会誌, **1** : 1-19.

- Inomata, R. 1984. Taxonomic and biological studies on *Pachyprotasis* (Hymenoptera, Tenthredinidae). II. Description of four new species from Japan. *Kontyu*, **52** : 309-320.
- 猪股凉一, 1986. キモンハバチ属 (*Pachyprotasis*) における斑紋の形状に関する考察 (2). 浪速短期大学紀要, **10** : 32-47.
- 猪俣凉一, 1989a. 北海道産ハバチ類 (膜翅類) について(3) -クロハバチ属 *Macrophya* (ハバチ科). 浪速短期大学紀要, **13** : 103-124.
- 猪股凉一, 1989b. ハチらしくないハチの話 (四) -親は必ず子の食べ物に産卵するか-. 浪速短期大学学報「浪速」, (**196**) : 56-67.
- 李鐘郁・柳聖萬・全永太・鄭鐘喆, 2000. Hymenoptera (Symphyta: Tenthredinidae). Economic Insects of Korea 2. *Insecta Koreana Suppl.* **9** : 1-222.
- Malaise, R., 1944. Entomological results from the Swedish expedition 1934 to Burma and British India. Hymenoptera: Tenthredinidae. *Arkiv for Zoologi, Bd 35A*. **10** : 1-58.
- 室田忠男・黒川秀吉, 1985. 広腰亜目. 福井県自然環境保全調査研究会編, 福井県昆虫目録, pp.246-257.
- Naito, T., 1969. The genus *Pseudohemitaxonus* of Japan, with descriptions of two new species (Hymenoptera, Tenthredinidae). *Kontyu*, **37** : 403-408.
- Naito, T. 1971. A revision of genus *Hemitaxonus* in the old world, I. *Kontyu*, **39** : 19-28.
- Naito, T., 1979a. Japanese species of the genus *Neostrombocerus* Rohwer. *AKITU*, **23** : 1-8.
- Naito, T., 1979b. New host record of the Selandriinae from Japan (Hymenoptera, Tenthredinidae). *AKITU*, **23** : 8.
- Naito, T., 1980. Studies on the Japanese sawflies of the genus *Strongylogaster* Dahlbon. *Kontyu*, **48** : 390-401.
- Naito, T., 1982. Chromosome number differentiation in sawflies and its systematic implication (Hymenoptera, Tenthredinidae). *Kontyu*, **50** : 569-587.
- Naito, T., 1988. Systematic position of the genus *Rocalia* (Hymenoptera, Tenthredinidae) feeding on fern spores, with description of a new species from Japan. *Kontyu*, **56** : 798-804.
- 内藤親彦, 1988. ハバチ類の食性と種分化-I. インセクトリウム, **25(5)** : 4-11.
- Naito, T., 1996. Phylogeny of the fern associated sawfly genus *Strongylogaster* Dahlbom (Hymenoptera: Tenthredinidae). *Memoirs Entomol. Soc. Wash.*, **17** : 161-178.
- 内藤親彦, 2002. ハバチ類の種分化の多様性. ハチとアリの自然史 (杉浦直人・伊藤文紀・前田泰生編著) : pp.165-178. 北海道大学図書刊行会.

- 南部敏明, 1998. 埼玉県の膜翅目 (ハチ・アリ類). 埼玉県昆虫誌III, pp.9-92. 埼玉昆虫談話会.
- 岡山県, 1978. 岡山県の昆虫 -岡山県昆虫生息調査報告書-.
- 岡山県, 2003. 岡山県版レッドデータブック 絶滅の恐れのある野生動物.
- 奥田素男, 1994. ニホンキバチ・オナガキバチ. 森林昆虫-総論・各論- (小林富士雄・竹谷昭彦編著): pp.235-238. 養賢堂.
- Okutani, T., 1954. Studies of Symphyta (I). Symphyta of Sasayama with description of a new species. 兵庫農科大学研究報告 農学編, **1** : 75-80.
- Okutani, T., 1956. New sawflies from Japan (Studies on Symphyta VI). *Insecta Matsumurana*, **20** : 97-99.
- Okutani, T., 1958. Three new species of Japanese Symphyta (Studies of Symphyta XI). *MUSHI*, **32** : 143-146.
- Okutani, T., 1961. New species of *Pachyprotasis* from Japan (Hymenoptera, Tenthredinidae) (Study of Symphyta XIII). *Kontyu*, **29** : 172-174.
- 奥谷禎一, 1967a. 日本産広腰亜目(膜翅目)の食草(I). 応動昆, **11** : 43-49.
- 奥谷禎一, 1967b. 日本産広腰亜目(膜翅目)の食草(II). 応動昆, **11** : 90-99.
- 奥谷禎一, 1970. 日本産広腰亜目の食草(III). 応動昆, **14** : 25-28.
- Okutani, T., 1972. A new genus and a key to Japanese genera of the subfamily Blennocampinae (Hym., Tenth.). *Ent. Rev.*, **24** : 57-61.
- 奥谷禎一, 1974. 中国山脈東端の昆虫相. 東中国山地自然環境調査報告 : pp.173-231. 氷ノ山・後山・那岐山国定公園三県協議会, 神戸.
- 奥谷禎一, 1982a. 日本の広腰亜目IV. 昆虫と自然, **17(9)** : 19-21.
- 奥谷禎一, 1982b. キバチ・ハバチ類. 岐阜県の昆虫 (岐阜県昆虫調査報告), pp.409-413, 岐阜県.
- 奥谷禎一, 1983a. 日本の広腰亜目VII. 昆虫と自然, **18(9)** : 22-23.
- 奥谷禎一, 1983b. 日本の広腰亜目VIII. 昆虫と自然, **18(12)** : 22-26.
- 奥谷禎一, 1987. 木材に穿孔するキバチとクビナガキバチについて. 文化財の虫菌害, **13** : 19-29.
- Okutani, T., Tsuruta, K. and Shinohara, A. 1992. Records of *Neocholochelyna itoi* (Hymenoptera, Tenthredinidae) in Honsyu. *Jpn. J. Entomol.*, **60** : 238.
- 大阪府, 2000. 大阪府野生生物目録.
- 佐藤, 1958. ハナセヒラクチハバチ. *Nature Study*, **4(5)** : 11.
- Seiyama, Y., 1981. A revision of Japanese species of the genus *Eutomostethus* Enslin (Hymenoptera : Tenthredinidae). *Trans. Shikoku Ent. Soc.*, **15** : 155-171.
- 清山恵夫, 1989. 長崎県の膜翅目広腰類. 長崎県の生物, pp.173-176. 長崎県生物学会.

- Shinohara, A., 1987. The sawfly genus *Onycholyda* (Hymenoptera, Pamphiliidae) of Japan V. *Kontyu*, **55** : 486-501.
- Shinohara, A., 1988. The group of *Pamphilius sylvaticus* (Hymenoptera, Pamphiliidae) - Five new species and additional records from the Far East -. *Kontyu*, **56** : 307-320.
- Shinohara, A., 1992. The sawfly genus *Megaxyela* (Hymenoptera, Xyelidae) in East Asia. *Jpn. J. Entomol.*, **60** : 783-796.
- Shinohara, A., 1994. *Tenthredo viridatrix nippon* n. subsp. (Hymenoptera, Tenthredininae) from Japan and Sakhalin. *Proc. Jpn. Soc. syst. Zool.*, **51** : 51-58.
- 篠原明彦, 1998. 日本産ハチ目科名表 広腰亜目. 日高敏隆 監修 日本動物大百科10 昆虫III, pp.65-66. 平凡社, 東京.
- Shinohara, A., 1998. Pamphiliid sawflies (Hymenoptera, Symphyta) from Kyushu, southwestern Japan. *Mem. Natn. Sci. Mus.*, **31** : 237-246.
- Shinohara, A., 1999. A study on stem boring sawflies (Hymenoptera, Cephidae) of the tribe Hartigiini from Japan and Korea. *Jpn. J. syst. Ent.*, **5** : 61-77.
- Shinohara, A., 2000a. Description of the previously unknown female of *Pamphilius basilaris* (Hymenoptera, Pamphiliidae). *Mem. natn. Sci. Mus.*, **33** : 161-165.
- Shinohara, A., 2000b. Pine-feeding webspinning sawflies of the *Acantholyda posticalis* group (Hymenoptera, Pamphiliidae). *Bull. natn. Sci. Mus., Ser. A*, **26** : 57-98.
- 篠原明彦, 2000. 皇居のハバチ・キバチ類. 国立科学博物館専報, **36** : 295-305.
- Shinohara, A., 2001. The group of *Pamphilius sylvaticus* (Hymenoptera, Pamphiliidae) : Two new species, new collection records, and a key to Palearctic species. *Jpn. J. Syst. Entomol.*, **7** : 99-116.
- Shinohara, A., 2002a. Sawflies of the subgenus *Tenthredina* (Hymenoptera, Tenthredinidae) in Northeastern Asia. *Bull. natn. Sci. Mus., Ser. A*, **28** : 151-157.
- Shinohara, A., 2002b. Pamphiliid sawflies (Hymenoptera, Symphyta) from Kamiange at the foot of Mt. Jinbayama, southwestern Tokyo. *Mem. natn. Sci. Mus.*, **38** : 179-194.
- Shinohara, A., 2003. *Pamphilius basilaris*, a leaf-rolling sawfly (Hymenoptera, Pamphiliidae) associated with the Juglandaceae. *Bull. Natn. Sci. Mus., Ser. A*, **29** : 147-151.
- Shinohara, A. and Hara, H., 1995. A new host record for *Pamphilius itoi* (Hymenoptera, Pamphiliidae). *Jap. J. Ent.*, **63** : 572.
- Shinohara, A. and Hara, H., 1997. Occurrence of *Pamphilius benesi* (Hymenoptera, Pamphiliidae) in Hokkaido, Japan, and notes on its gregarious leaf-rolling larvae on

- Corylus sieboldiana*. *Jap. J. Ent.*, **65** : 851-852.
- Shinohara, A. and Hara, H., 1999. Host-plant record of six pamphilline sawflies (Hymenoptera, Pamphiliidae) in Hokkaido, Japan. *Bull. natn. Sci. Mus., Ser. A*, **25** : 123-128.
- Shinohara, A. and Okutani, T., 1983. Host-plants of Japanese Pamphiliidae (Hymenoptera, Pamphiliidae). *Kontyu*, **51** : 276-281.
- 篠原明彦・奥島雄一, 2000. 岡山県初記録のハバチ2種. すずむし, **135** : 1-2.
- Smith, F., 1874. Description of new species of Tenthredinidae, and of Japan. *Trans. Ent. Soc. London*, pp.373-386.
- Smith, D. R., 1979. Asynopsis of the sawflies, suborder Symphyta. In "Catalog of Hymenoptera in America North of Mexico" (edd. Krombein, K.V. et al.), pp.3-137. *Smithsonian Institution Press*. Washington, D.C.
- Smith, D. R. and Shinohara, A., 2002. The stem-boring sawfly genus *Cephus* (Hymenoptera, Cephidae) in Japan. *Proc. ent. Soc. Wash.*, **104** : 479-484.
- Sugiura, S. and Yamazaki, K., 2003. Host plant, oviposition behavior and larval ecology of a sawfly leafminer, *Profenusa japonica* (Hymenoptera: Tenthredinidae). *Entomological Science*, **6** : 247-251.
- Taeger, A. and Blank, S. M., 1996. Kommentare zur Taxonomie der Symphyta (Hymenoptera) (Vorarbeiten zu einem Katalog der Pflanzenwespen, Teil 1.) *Beitr. Ent.*, **46** : 251-275.
- Takeuchi, K., 1939. A systematic study on the suborder Symphyta (Hymenoptera) of the Japanese empire (II). *Tenthredo*, **2** : 59-105.
- Takeuchi, K., 1940. A systematic study on the suborder Symphyta (Hymenoptera) of the Japanese empire (III). *Tenthredo*, **3** : 187-199.
- Takeuchi, K., 1941. A systematic study on the suborder Symphyta (Hymenoptera) of the Japanese empire (IV). *Tenthredo*, **3** : 230-274.
- Takeuchi, K. 1951. New and unrecorded sawflies from Shikoku, Japan I. *Trans. Shikoku Ent. Soc.*, **2**: 57-62.
- 富樫一次, 1972. ハバチ類5種の食草. 応動昆, **16** : 217-218.
- 富樫一次, 1976. ハバチ類4種の食草. *Habachia*, **3** : 1-3.
- Togashi, I., 1990. Japanese and Korean sawflies of the genus *Hemichroa* Stephens. *Trans. Shikoku Ent. Soc.*, **19** (3) : 109-116.

- Togashi, I., 1992. Japanese sawflies of the genus *Taxonus* Hartig (Hymenoptera; Tenthredinidae) (Part 1). *Proc. Japan. Soc. Syst. Zool.*, **47** : 37-44.
- Togashi, I., 1993. Sawflies of the genus *Perineura* Hartig from Japan (Hymenoptera : Tenthredinidae). *J. Hymenoptera Res.*, **2** : 189-194.
- Togashi, I., 1995. Description of *Neocholochelyna hakusana*, sp. nov., and its larva (Hymenoptera: Tenthredinidae) from Japan. *Proc. Entomol. Soc. Wash.*, **97** : 866-871.
- Togashi, I., 1997. Symphyta (Hymenoptera) collected by Dr. Y. Nishijima in Hokkaido, Japan. *Bulletin of the Biogeographical Society of Japan*, **52(1)** : 1-6.
- 富樫一次, 1998. ハチ目. 石川県の昆虫, 252-304. 石川県.
- Togashi, 1999. Japanese species of the genus *Periclista* Konow (Hymenoptera, Tenthredinidae). *Jap. J. syst. Ent.*, **5** : 33-41.
- Togashi, I., 2001. The conifer sawfly genus *Monoctenus* (Hymenoptera, Diprionidae) in Japan. *Jap. J. syst. Ent.*, **7** : 41.
- 富樫一次, 2002. 広島県産ハバチ類分布資料. 比和科学博物館研究報告, **39** : 101-105.
- 富樫一次・山本栄治, 2000. 小田深山およびその周辺のハバチ類とキバチ類. 小田深山の自然 II, pp.705-723. 愛媛県小田町.
- 山口県, 2002. レッドデータブックやまぐち 山口県の絶滅のおそれのある野生生物.
- 山口県立山口博物館, 1988. 山口県の昆虫.
- 山田雅輝, 2000. 青森県から初めて記録するハバチ亜目の10種. 青森自然史研究会会誌, **5** : 53-54.
- 吉田浩史, 2002. 神戸市北区藍那のハチ類相 (1) ハバチ類. きべりはむし, **30(1)** : 62-65.

執筆者・調査協力者一覧

〔執筆者〕

内藤親彦 神戸大学農学部
吉田浩史 (株)ピー・シー・イー
中峰 空 三田市立有馬富士自然学習センター
森田年則 兵庫県職員
池田隆直 兵庫県職員
鈴木壽也 神戸市職員
中西明德 兵庫県立人と自然の博物館

〔標本採集協力者〕

相江 達也	二井 清友	五味 正志	後藤信太郎	浜西 洋
橋口 和幸	橋本 佳明	林 美小夜	広瀬 成俊	細田裕貴子
飯塚 哲也	井本 聡	石井 潤	磯野 昌弘	木谷 徹
北尾 昌弘	小高 教	小杉由紀夫	小山 敏克	熊代 直生
久ノ坪ゆかり	黒田 誠	李 載旼	丸橋 温	松本 雅之
三木 健史	水野 沙織	森谷 正之	中尾 健良	大塚 剛二
櫻井 厚司	坂本 敏郎	笹井 隆邦	重村 太博	杉浦 直人
高野俊一郎	竹田真木生	竹中 勲	寺本 時靖	東野 洋平
植田 義輔	上野 高敏	八木 剛	矢代 学	吉田 洋子
吉田 洋介				

〔標本データ提供者〕

篠原明彦 遠山雅夫 西本 裕
大阪府立大学農学部昆虫学教室 大阪市立自然史博物館

〔この冊子について〕

この冊子にとりまとめたハバチ類に関する研究は、兵庫昆虫研究会(代表：内藤親彦)が兵庫県立人と自然の博物館からの委託を受けて実施した調査業務、データベース化業務および関連の知見を総括したものである。

兵庫県立人と自然の博物館のデータバンク事業

自然環境に関する情報は、莫大な資料として存在しています。博物館の標本情報や研究成果、行政の実施した環境調査、自然愛好家による調査、大学の研究者による調査など枚挙に暇がありません。兵庫県立人と自然の博物館では、開館以来、各地に分散する様々な情報の収集を図り、自然環境に関する情報を一元的に集約し、展示や環境行政支援などの様々な用途へと活用しています。

■自然環境情報の収集

博物館は標本を収集するだけではありません。標本作成が容易な小型の生物とは違って、大型の哺乳類や鳥類、自然地形等は、標本を収集すること自体が難しいため、情報でしか記録を残すことができません。また、絶滅に瀕している動植物は、むやみやたらに標本にすることで、自然環境の破壊に繋がることが懸念されます。標本や書籍以外にも、古い写真やメモなども、かけがえのない情報となります。こうした情報を、様々な形で利用しやすいように、各種データベースや地理情報システム (GIS) を活用して電子データとしての整備を行っております。

〔業務内容〕

- ・収蔵資料のデジタル化および公開データベースの作成
- ・自然環境情報に関連した出版物の発行
- ・博物館情報システムの開発
- ・委託調査業務の実施
- ・簡易GISの提供
- ・レッドデータブック掲載種に関するとりまとめ
- ・一般からの質問および提供情報のデータベース化
- ・リサーチプロジェクトの実施

■自然環境情報の活用

博物館が整備している自然や環境に関する情報は、地域資源の保全を行うためには欠かせないものです。これまでに、環境影響評価やレッドデータブックの作成など様々な環境行政に関する事業で博物館の有する情報が利活用されております。一方的に提供するだけでなく、行政職員や一般向けにやや専門的な講習会を開催して、利活用の促進を図っております。また、より多くの方に情報を利用して頂けるよう、研究員の調査成果や一般から寄せられた情報など、県内の自然環境に関する各種情報を博物館内の展示端末やインターネットを通じて成果の公開を行っております。

〔業務内容〕

- ・行政機関への情報提供
- ・学術目的での情報提供
- ・環境情報の活用に関する受託業務
- ・自然環境情報システムの設計・開発および各種支援業務
- ・行政職員への研修会の開催

(シンクタンク事業室)

兵庫県立人と自然の博物館
自然環境モノグラフ 1号

兵庫県におけるハバチ類の種多様性

2004年3月31日 印刷

2004年3月31日 発行

発行 兵庫県立人と自然の博物館

〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘6丁目

印刷 アイシー印刷株式会社



〒669-1546 三田市弥生が丘 6 丁目
tel.079-559-2001 fax.079-559-2007
6chome Yayoigaoka Sanda Hyogo, Japan 669-1546