

Plate 2-3. Venation patterns (closed up) of neotropical *Beilschmiedia* species (continued). q. *B. riparia* (Lorea 5498). r. *B. steyermarkii* (Contreras 9448). s. *B. stricta* (Nunes 313). t. *B. taubertiana* (Araujo s.n.). u. *B.* sp. 1 (Haber 11070). v. *B.* sp. 2 (Forias 243). w. *B.* sp. 3 (Lorence 4078). x. *B.* sp. 4 (Guindon 40). y. *Hufelandia latifolia* (Tanner 709). z. *H. tovarensis* (van der Werff 10584). Scale bars equal 2 mm.




Plate 3-1. Adaxial cuticles of neotropical *Beilschmiedia* species. a. *B. alloiophylla* (Clark 850). b. *B. angustielliptica* (Núñez 1159). c. *B. angustifolia* (Constantino 19914). d. *B. berteroana* (anonymous). e. *B. brenesii* (Bello 580). f. *B. costaricensis* (Lorea 5563). g. *B. curviramea* (Persaud 70). h. *B. hexanthera* (van der Werff 12951). Scale bars equal 50 μm .




Plate 3-2. Adaxial cuticles of neotropical *Beilschmiedia* species (continued). i. *B. hondurensis* (Lundel 19280). j. *B. mexicana* (Croat 65900). k. *B. miersii* (Taylor 10883). l. *B. ovalis* (Sytsma 2148). m. *B. pendula* (Herrera 5861). n. *B. rigida* (Martinelli 12889). o. *B. riparia* (Maya 1296). p. *B. steyermarkii* (Contreras 9448). Scale bars equal 50 μm .